

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

PHTHISI PULMONALI.

1818.

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

PHTHISI PULMONALI.

2

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE
PHTHISI PULMONALI;

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,
D. GEORGII BAIRD, SS.T.P.
ACADEMIAE EDINBURGENAE PRAEFECTI;

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI Consensu;
Et NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE Decreto;

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subjicit

JACOBUS M^cDOUGLE,

BERVICENSIS;

UNUS E COLLEGIO REGIO CHIRURGORUM LONDONENSI.

Ad diem 24. Junii, horâ locoque solitis.

By slow, and silent, but resistless sap,
In his pale progress gently gaining ground,
————— in spite of art. YOUNG.

EDINBURGI:

EXCUDEBANT C. STEWART ET SOCII,
ACADEMIAE TYPOGRAPHI.

1801.

DISSECTATIO MEDICA

IN ANATOMIA

DE

PHTHISI PULMONALI;

PRO EXAMINE

ANNO

MDCCCXXXIII

AB ANATOMICO INSTITUTO

WILHELMI CAROLI

WILHELMI CAROLI

WILHELMI CAROLI



Digitized by the Internet Archive
in 2020 with funding from
Wellcome Library

WILHELMI CAROLI

WILHELMI CAROLI

WILHELMI CAROLI

AUCTOR

EMERITUS

WILHELMI CAROLI

1833

DISSERTATIO MEDICA

VIRO EXIMIO,

GULIELMO BLIZZARD, ARMIGERO,

NOSOCOMIÆ LONDINENSIS CHIRURGO,

ARTEM CHIRURGICAM

PER MULTOS ANNOS SUMMA LAUDE

EXERCENTI,

ÆQUE AC DOCENTI;

HOC OPUSCULUM

SACRUM VULT

AUCTOR.

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

PHTHISI PULMONALI.

AUCTORE JACOBO M. DOUGLE.

PULMONES organa quàm maximi in corpore momenti; quippe in quos propellatur totus à reliquo corpore sanguis ad dextrum ventriculum cordis redux, miras in iisdem mutationes, aëris cæli actionis ope, subiturus. Hos itaque multis morbis, et gravibus quidem, sæpe laborare minimè mirandum. Ex his unus, Phthisis scilicet Pulmonalis, hujus tentaminis argumentum, stat selectus. Nulla forsan orbis regione adeo quam in hac insula frequens; nullo certè alio morbo tanta vis nostrùm proster-

tur. Ad talem crebritatem cæli intemperiem multùm conferre nequaquam dubitandum, ejus autem mutabilitas, tùm quod ad humiditatem, cùm ad calorem, frigusque, multo plus; nam in regionibus septentrionalibus, ubi cælum stabiliùs manet, phthisis multò rariùs quam apud nos invenitur.

Hunc in opere nosologico Culleni characterem morbi habemus. “ Corporis emaciatio et
“ debilitas, cum tussi, febre hectica et plerum-
“ que expectoratione purulenta. ” Huic forsàn adjicere liceat; in pectore dolor, qui sanè ut plurimum, sic et dyspnœa, quæ semper adfit. Expectoratio purulenta plerumque non adest, nisi in stadio morbi proVectiori; neque tum semper, nam pus in vomica inclusum diu, vel etiam ad mortem usque interdum, possit manere; neque quidem à muco semper est dignoscendum; ad hoc enim experimenta usitata fallacia haud rarò videntur.

HISTORIA.

HISTORIA.

Inter pubertatem et annum trigesimum quintum præcipuè grassatur; aliquando autem in teneri ætate pueros, neque rarò homines ætate provectiori abripit.

Illis qui sæpissimè hoc morbo laborant forma est exilis, thorax arctus, cutis lævis et color faciei roseus; in primis vitæ temporibus hæmorrhagia narium frequens fermè fuit, vel glandularum lymphaticarum tumore et ulceratione scrophula se ostendit; eos porrò, quorum parentes eodem morbo laboravere, magnoperè aggreditur; feminas magis quam viros. Color faciei roseus non semper obtinet, sæpe enim pallor et languor eminent.

In tali præditi formâ, crasique supra delineata, tussis sicca post decubitum præcipuè molesta, cum lassitudine insolita et universali, primum plerumque indicium mali ineuntis. Hanc ponderis vel angustiae in pectore sensus, cum in quadam

quadam thoracis parte dolore, mox comitatur; frigoris molestè fertur gradus, sano haud ingratus: in latus dolore affectum ægrè decumbitur, et licèt nullus adsit dolor, decubitus in unum laterum plerumque difficilis. † Respiratio post partum, vel corporis exercitationem præcipuè festinatur; pulsus frequens est, et initio durus; algore atque calore fugaci æger afficitur, qui tandem in febris hæcticæ exacerbationes regulares vespertinas desinant, quas progrediente morbo sudores profusi, non semper totum corpus, sed caput pectusque potius occupantes, sequuntur; his corpus debile admodum fit et valde marcescit. Ad meridiem quoque exacerbatio adest, sed multò minus notabilis quàm vespertina;

† Nonnunquam etsi magna fuerit strages pulmonibus nullus adfuit dolor. “ In cadaveribus nonnullorum phthisicorum, qui dum in vivis agerent, de nullo pectoris dolore conquesti fuerant; occurrebant in pulmonibus ulcera insignia, cum maxima partis consumptione. ” LIEUTAUD, tom. i. 489.

vespertina; hæc horam quintam circiter advenit: facies pallida est nisi in media gena, ubi rubor circumscriptus, ingravescente hæctica auctus: urina rubra est, sedimentum deponens, quod in um vas vix unquam attingat: post partum vel tussim nonnunquam vomitur: fanguis è brachio missus superficiem coriaceam albam per totum morbi decursum sæpe exhibet.

Progrediente morbo, tussis dura ac scindens quasi fit, atque expectoratione purulenta ferme stipatur, varii scilicet coloris, subflavi, viridisque, fætorem exhalante, in aquam immissa haud æquè ac muco coherente, sed superficiem laccæram ostendente; hæc aliquando sanguinis paululo misceatur, sed rariùs magnâ copiâ: concretiones calcareae, sed minimè frequenter, è pulmonibus tussi rejiciuntur. Horrores frequentes ægrum concutiunt: lingua et fauces valde rubescunt, et morbi finem versus aphthis occupantur: cibi appetitus non tantùm imminuitur quàm in aliis morbis febrilibus solet: sæpe in decursu morbi dysuria fit: constipatio plerum-

que in progressu adest, sed in ultimis stadiis diarrhœa supervenit, alii sine diarrhœa moriuntur, alii paucis post ejus adventum diebus, et quando se ostenderit semper ferè desperandum: rarò diarrhœa et sudores eodem tempore adfunt, hi enim cum illa potius alternant. Propter debilitatem tument pedes et ima crura; tantaque est macies ante mortem, ut, in iis, qui diu decuberint, ossa ilium et sacrum cutem quâ teguntur perforant; decidunt capilli, ungues curvantur. Spe valetudinis secundæ animus ferè semper illuditur. Mens integra manet usque ad paucos dies ante mortem, ubi haud rarò delirium advenit quod ad exitum perfitet.

A suffocatione moritur interdum, nempe ubi magnæ vomicæ pus, bronchiis erosis, in tracheam ruat, ægro tam debili jam facto ut idem excreare nequeat.

Nonnunquam à magno vase pulmonali rupto anima efflatur.

Tali modo incedit plerumque morbus: in hieme vel ineunte vere, mutabili admodum tempestata,

pestate, præcipuè se ostendit; in æstivo tempore haud rarò omnia signa mitiora fiunt, vel omninò amoveri videantur, donec redeat hiems, cum malum iterum ingravescat; et multis similibus aggressionibus, temporis mitioris accessu solvendis, idem tentari possit antequam formam sævissimam induat morbus.

SECTIO CADAVERUM.

Inspecto post mortem thorace, adhæsiões pleuram costalem inter et pulmonalem primo observantur, quæ sanè his in regionibus tam crebrè reperiuntur in ætate provectiori, ut vix inter morbi signa recenserì debeant: partes interiores perscrutando scalpello, tubercula plerumque deteguntur, alia adhuc solida, alia mutata in pus, haud quale apud chirurgos laudabile nuncupatur, sed materiem caseosam latici mixtam; illa sunt dura corpora et rotunda, atque cum incisa sint colore subalbido; primùm admodum parva, sed ad pisi magnitudinem crescunt; nul-

lam

lam capsulam sibi propriam habere dicuntur; glandulæ induratæ olim credebantur, hoc autem nuper fuit negatum, quod in membrana pulmonum cellulari nullæ glandulæ adhuc sunt repertæ; haud exinde tamen pro certo ducere fas est tales non existere, in sano enim homine tam parvæ esse possint ut observationem eludant; ad hanc itaque opinionem antiquiorem, ob nexum phthisin inter et scrophulam, (morbum glandulas lymphaticas maxumè afficientem), et similitudinem glandulas mesenterii morbosas || inter et tubercula, ipse haud parùm propensus. Aliquando multò grandiora fiunt; sic apud Morgagnum descriptum habemus, “
 “ ram substantiam ad pyri majoris magnitudi-
 “ nem, quæ substantiam indurati pancreatis
 “ quodammodo referebat, in ejusque medio
 “ parvum ulcus puris plenum; †” hæc autem
 constitit

|| Vide Letter from Mr. Bowles—*Beddoes on Consumption.*

† Epist. xxii. 15.

constitit probabilè multis minoribus tuberculis simul concretis. Nonnunquam plurimæ congeries simul concrevisse videntur, unâ magnâ vomicâ sic formatâ, magnam pulmonis partem occupante: vasa sanguifera, ubi tales abscessus introeunt, ostia contracta, vel omninò clausa habent; hinc ratio est petenda cur hæmorrhagia profusa tam rarò in phthisi fit, ubi, propter abundantiam in pulmonibus vasorum sanguinem vehementium, aliter frequentissima foret: concreciones calcareæ et in pulmonibus ipsis et glandulis bronchiarum aliquando conspiciuntur: feri effusio, ob vasa impedita, haud insolita est. Tabem mesentericam cum phthisi adfuisse haud rarò discimus à glandulis meseraicis inflammatis vel suppuratis, quæ in utroque statu admodum similes sunt tuberculis.

B

DIAGNOSIS.

DIAGNOSIS.

A catarrho difficiliùs quàm alio quovis morbo dignoscitur; ab hoc autem phthisis primo stadio distinguitur quando tussis primùm levis fuerit et gradatim increverit, sine narium secretionem aucta, et quando expectoratio nulla, vel non nisi pituitæ paululum tussim insequatur, postremò ubi diutiùs permanerit quàm catarrhus solet; interdum fanè à vero catarrho potest oriri, quod diagnoseos difficultatem multùm auget. In stadio proVectiori febris hectica phthisin maxumè distinguit, vera hectica enim nunquam in catarrho adest; huic expectoratio purulenta adjici possit, sed, ut suprà diximus, hæc à muco è pulmone ejecto non semper distinguitur; est tamen ubi putatur certè distingui posse.

CAUSÆ

CAUSÆ PRÆDISPONENTES.

Inter causas, quæ corpus phthisi obnoxium reddant est debilitas, sive congenita, vel ab alio morbo orta, vel ab usu remediorum infirmantium; usus arsenici in febribus intermittentibus hunc effectum habere dicitur; primum tamen inter causas prædisponentes locum habet labes scrophulosa hæreditaria; hîc quoque recenferi debet forma corporis exilis, de qua supra egimus, et temperamentum hæmorrhagicum.

CAUSÆ EXCITANTES.

Quicquid pulmonibus adhibitum eos ad materiem fecernendam, quam vasa absorbentia haud auferant, phthiseos causa excitans esse possit; hinc ratio est petenda ejus crebritatis apud opifices quasdam pulveri admodum subjectos, qua-

les sunt linipolæ et lapidæ. Simili ferè modo perito phyfiologo † morbus cani datus est:— Sectâ venâ hydrargyri injecit drachmas duas; duobus post diebus, febris, pulsus frequens et durus, cum dyspnœa adfuerunt, et brevi tempore canis mortuus est: aperto thorace tubercula sunt conspecta, alia jam purulenta, alia adhuc dura et horum utriusque in medio globulus hydrargyri. Frequentissima autem causarum excitantium est frigus corpori applicatum; huic vestitus tenuis apud nos usurpatus, sexu præcipuè altero, admodum favet: aër frigidus plus nocet cuti applicatus quam pulmonibus, hi enim, modo corpus calidius vestiatur rarò aliquid detrimenti inde accipiant. Exanthemata nonnunquam phthisin inducunt: asthma quoque sæpe in eam definit: suppressio mensium causa fuit existumata, plerumque autem talis suppressio à corporis affectu, magis quam hic ab illa pendet.

Annon

† Dr. Haighton.

Annon unquam apud nos contagiosa sit, medicis dubium; apud Hispalienses autem tantum hoc suadetur, ut mortuorum vestimenta leges incendi jubeant: plerumque ubi à contagione hic visa fuerit orta, aliam causam, ut nimiam defatigationem, frigori objectionem, in ægro curando, vigilando, eandem suscitasse, cum clar. Gregorio sentimus: non desunt tamen viri summâ observantiâ, qui hic quoque contagiosam esse nonnunquam opinantur, atque maritos, cum fœminis phthificis decumbentes, eam exinde accepisse.

CAUSA PROXIMA.

Sunt qui crediderunt varietatem esse phthiseos sine ulcere pulmonis, materia purulenta a membrana cellulas tegente secreta. Post inflammationem empyema nonnunquam fieri, integra pleura, clar. G. Hunter jampridem monstravit: constat quoque ex plurimis sectionibus nullum adfuisse ulcus in pulmonibus nonnullorum omnia

nia dum viverent phthiferos signa habentium; fas est credere propterea talem varietatem aliquando fieri.

Ulcus tamen in pulmone plerumque adest, et oriri videtur a tribus præcipuè causis, pneumonia nempe, hæmoptysi, et tuberculis.

Pneumonia, modo remedia tempestivè adhibeantur, rarò usque ad suppurationem incedit, vel licèt hoc acciderit, pulmone aliter sano, vomica excreata, quamvis plurima phthiferos signa adsint, ulcus brevi tempore sanari possit; eos contra, quibus phthisi proclivitas, suppuratio post pneumoniam summo jaçtabit periculo.

Ulcus in pulmone fieri per vasa in hæmoptysi frequenter rupta alii putavere; alii majore veresimilitudine, sanguinem effusum et acrem factum ulcerationem partium vicinarum inducere posse. Hæmoptysis autem in eodem ferè temperamento, eodemque vitæ tempore ac phthifis se ostendit; haud rarò itaque, quando hanc induxisse potuerit videri, comes tantum indolis phthificæ fuerit; et quomodo tubercula hæmoptysin,

ptyfin, brevì in phthifin abituram, inducere poffint, facilè intelligetur.

Tubercula frequentiffima longè ulceris in pulmone, et phthifeos exinde funt caufa †; in iis à ftirpe fcrophulofa ortis maxumè inveniuntur, fed alios quoque adoriuntur: primo adeo funt minuta ut diu manere poffint fine magno incommodo; tandem verò, ab aliqua irritatione fortuita, inflammantur, fuppurant et morbum peffimâ formâ inducunt. †

RATIO

† Dr. F. Simmons affirmat quod pulmonibus quamplurimum, a Phthifi jugulatorum, atque feipfo poft mortem infpectorum, tubercula nunquam omnino abeffent.

‡ A fcorbuto infuper ulcus pulmonis nonnunquam fit. “ In cadaveribus variorum fcorbuticorum, pulmones inveniebantur purulenti, arcte pleuræ, mediastino, pericardio et diaphragmati hærentes. ”

Ex Actis Paris:—Vide LIEUTAUD.

RATIO SYMPTOMATUM.

Ab irritatione tuberculorum inflammatorum vel puris pendet tuffis ; dolor ab inflammatione ; à pulmonibus infarctis, fanguinis motum et aëris aditum impredientibus, dyspnœa ; tuffis post decubitum magis vexat, quia tum vestes calefactas exuat, lectum frigidiorum intret æger ; in latus affectum ægrè decumbitur, forsan quod fanguis majori vi illuc tum propellatur ; febris hectica ab irritatione puris absorpti ; ab hectica sudores colliquativi et debilitas ; vomitus a nexu pulmones inter et ventriculum ; corporis emaciatio ab adipe, et fibrarum musculosarum fortassis parte, absorpta ; pedum tumor à debilitate, sicut unguis curvati et delapsi crines ; diarrhœa à pure acri ad intestina translato pendet.

Etsi dixerimus hecticam à pure absorpto oriri, nequaquam opinamur hoc unicam esse causam hecticæ ; ab irritatione enim et debilitate, nul-

la suppuratione facta, sæpe nasci videtur, atque tum idiopathica plerumque est habenda.

PROGNOSIS.

Eorum, qui in hunc morbum vere implicati fuerint tam exigua pars vel naturâ, vel arte eripitur, ut prognosis semper sit infausta; maxime autem quando sudores profusi sint, simul cum diarrhœa, corpore admodum marcescente, viribusque altè fractis, si his accedat delirium, actum est.

Minus infausta verò est putanda, si non diu permanferit morbus, neque hæreditarius, sudoribus nullis, vel lenioribus tantùm stipatus, ægro haud multùm infirmato, atque veniente æstate refecto. Nonnulli post pessima ferè signa convalescunt; indicia nulla tamen prodere possimus, à quibus hoc tam felix augurium sit ducendum. Ab alia causa quam tuberculis felicior æstimatur; de hoc autem vix liquet. Mania superveniente sistitur, nonnunquam tollitur. Gravidæ phthisi

affectedæ rarò moriuntur antequam partum edant, et a clar. Gregorio accepimus, se fæminas vidisse per plures partus vitam sustinentes, post ejus aggressum, infantes quoque lactantes, et sic sine alio remedio prorsus tandem sanatas.

RATIO MEDENDI.

Omnia remedia, ad phthisin confirmatam debellandam hucusque adhibita, semper ferè spem fefellerunt; nam etsi post gravia etiam symptomata nonnulli, ut supra diximus, convalescant, naturæ viribus magis quàm arti hoc est tribuendum. Multum curæ igitur est adhibendum ut contra ejus aditum præcaveatur, vestitu calido utendo, frigori expositione evitanda, corpore exercitatione et diæta idonea roborando.

In phthisi incipiente, licèt multum metuenda, feliciori exitu nonnunquam certatur.

Quando inflammatio in lateris dolore, tussi, pulsu duro et frequentiori, se primum ostenderit, illi adversari oportet venæsectione tempestivè adhibita,

hibita, et cautè, ne inde infirmior fiat æger, diæta mitiori, epispasticis juxta doloris sedem impositis. Opinatur Simmons balneum, non ultra gradum 92^m. calefactum, in hoc stadio haud parùm prodesse, urgente tussi et signis inflammationis: in balneo brevi tantum est manendum, postea decumbendum, sed non ad ciendum sudorem.

Si his remediis malum cedere recuset, ad cælum fervidius, modo res finant, iter per mare est faciendum. Hoc quidem præstantissimum est remedium quod adhuc novimus, ineunte morbo præsertim. Variis modis prodesse videtur; exercitatio, navigando nocte dieque, fit constans, nec vires exhaurit, adeo ut commoda sibi propria habeat. Nausea quoque et vomitus, navis motu excitatus, plurimùm prodest; et quamvis sæpe repetita debilitas inde oriatur, statim post iter perfectum, vel ventriculi malum subactum, æger reficitur et majori robore valetudineque plerumque gaudet. Vix igitur dubitandum quod maxuma pars commodi, a cæli
mutatione

mutatione capti, exercitationi et vomitui inter navigandum fit tribuenda.

Si migrare non liceat, urbs tamen est fugienda, ut in aliqua ruris parte salubri, cælo nempe arido et blando, degatur.

Aliæ exercitationis species multum profunt, equitatio præfertim; hoc est remedium quod tam egregie, et quidem plus justo laudavit Sydenham; mane tantum usurpandum, vespere enim plerumque nocet. Si his debilitas obstet, vel alia causa, frictio forsan vice earum possit usurpari.

Diæta mitis plerumque esse debet, ex vegetabilibus, frugibus et lacte confecta; sed si temperamentum fit pituitosum, cibus partim ex animalibus, et vini aquæ mixti paucillum est concedendum; plerisque sanè ægris cibi animalis nonnihil, atque gelatenosi et testacei præ alio, possit dari sine incommodo.

Lac nullis dotibus gaudet specificis, est autem anteponendum aliis cibariis, quia multum nutrimento præbet, sine stimulo cibum merè
animalem

animalem comitante, quem inter et vegetabilia medium locum tenet.

Centum jam anni præteriere a primo digitalis usu in medicina: in opere cujusdam Salmon, anno 1710 edito, hæc in phthisi pulmonali commendatur; postea autem desueta, vires ejus latebant, donec Dr. Withering eandem reduxit in usum. Sed quamvis in aliis morbis, hydrope præsertim, eximium sit remedium, neutiquam in phthisi summam laudem æquat, quibus à medico haud parvi nominis nuper fuit commendata: experientia enim aliorum (et nunc haud pauci ea usi sunt) docet pulsam minus frequentem plerumque fieri ab ejus usu, aliaque symptomata evadere nonnunquam mitiora, vix unquam autem quod accepimus, phthisin confirmatum inde radicitus sanari. Ad eam adhuc recentem debellandam tamen nonnihil valere videatur digitalis; constat enim vitam ejus ope fuisse productam, quod efficere videtur pulsus crebritate refrænanda, absorptione promovenda; non indigna ergo periculo ulteriori: dosis parva primum esse debet, guttæ scilicet quinque vel decem

cem tincturæ saturatæ ter in die, et hæc gradatim augeri queat usque ad quadraginta; si ventriculus rejiciat, vel instet vertigo, intermitteri, vel saltem minui oportet.

Cortice cinchonæ febris hectica aliquando sisti potest, brevè autem recurrit; tussis quoque et lateris dolor ex ejus usu ingravescunt, ideóque nunquam ferè est utenda. Similitudo febrem remittentem inter et hecticam hoc remedium primo aspectu suadet; sed symptomatica tantùm hic est, eoque cinchona haud prodest, at ubi idiopathica et à debilitate orta, ut in atrophia lactantium, non dubitandum quin multum commodi ab ea ducatur.

Cicuta, remedium deobstruens nuncupata, exinde phthificis fuit exhibita, et nonnullis medicis placet eam cum fructu posse usurpari.

Hydrargyrus, nisi in quibusdam raris exemplis a syphilitide ortis, neutiquam prodest.

Balsama olim usurpata stimulando nocent, ideóque vitanda.

Emetica plurimùm valent; pulmones exonerant expectoratione promovenda, fluidis ad superficiem

perficiem dirigendis; harum usu repetito malum non solùm levatur, sed sæpe etiam retardatur, imo nonnunquam omninò forsan amovetur. Ipecacuanha in hunc finem usurpari queat, sulphas cupri autem, vel zinci maxumè habetur idoneum; hoc vomitum instanter excitat et nulla ferè nausea sequitur, quæ post alia emetica gravis nonnunquam manet, et multùm vexat, nunquam catharsin suscitatur, contrà autem, si diarrhœa jam adfit, eandem cohibet, neque ventriculus exinde, pariter ac vomitoriis plerisque, debilior fit; quantitas pro dosi inter grana decem et triginta jacet, grana quindecim sufficiunt plerumque: sulphatis cupri dosis variat à granis duobus ad decem vel quindecim usque: aquæ uncia sex vel octo priùs sunt hauriendæ quàm hoc vel sulphas zinci fumatur.

Epispastica, urgente lateris dolore, ad eundem levandum sæpe sunt adhibenda; expectorationem quoque adjuvant et fluida derivant à pulmonibus: hâc ratione profunt quoque fonticuli et fetacea.

Præter remediorum de quibus supra egimus
usum,

ufum, ad fymptomata fingulatim fublevanda animus intendere oportet, sæpe enim hoc folùm medico facere liceat. Tuffis opio optimè levatur, in forma trochifci glycyrrhizæ cum opio. Frustra diarrhœa cathartica, ut rheo, tentatur, laxantia enim vix dari poffunt, ob conftipationem, sine periculo diarrhœam fufcitandi; meliùs cohibetur opio, kino, et catechu, parvâ quantitate cum mucilagine conjunctis, et frugibus fubacidis maturis, quæ licèt plerumque laxent diverfum effectum hîc præftant. Vaporibus aquæ calidæ in pulmones exceptis expectoratio facilior evadit. Haufibus effervescentibus compescitur vomitus; fudores acido fulphurico; æthere dyspnœa.

Gas hydrocarbonium inhalatum, aëre atmofphærico prius dilutum, levamen aliquid ut anodynum præbet et fomnum conciliat, eoque ufurpari poffit, fed citra hoc nihil videtur valere. Gas acidum carbonicum fimiles fermè effectus monftrat, fœtorem quoque puris ejecti multum imminuit.

F I N I S.